

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su:

KULLANILACAK İTİKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arası süre(gün)
ANTEPFİSTİĞİ	<u>Antepfistiğında karazenk (Pseudocercospora pistacina)</u>	75 ml/100 L su	21 gün
BAĞ*	<u>Bağ mildiyözü (Plasmopara viticola)</u>	100 ml/100 l su	21 gün
BİBER (Sera)	<u>Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)</u>	125 ml/100 L su	3 gün
BUĞDAY	<u>Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)</u>	75 ml/da	56 gün
BUĞDAY	<u>Sarı pas (Puccinia striiformis)</u>		
BUĞDAY	<u>Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis)</u>		
DOMATES (Sera)	<u>Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)</u>	125 ml/100 L su	3 gün
HIYAR (Sera)	<u>Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)</u>	100 ml/100 L su	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaşı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaşı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunun güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasının sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Antepfistiğında Karazenke karşı

1.uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyondan önce , yaprakların açılmaya başladığı dönemde, tedavi edici fungusitlerle yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açıldığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.



MCP ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ

RESPECTOR

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	G1:3; C3:11	Fungisit(Mantar ilacı)
------	-------------	------------------------

200 g/L Tebuconazole +120g/L Azoxystrobin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI

SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2

SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE

TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE

1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE

ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA

TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER

TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Tebuconazole

Azoxystrobin

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ:TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H361 - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391 - Döküntüleri toplayın.

P405 - Kilit altında saklayın.

P501 - İçeriği/kabı; yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

Domates (Sera) ve Biber (Sera) patlıcangillerde küllemeye karşı uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Hıyar (Sera) kabakgillerde küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir.

Buğdayda tahl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

RESPECTOR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3; C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için RESPECTOR 'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3; C3:11) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



MCP ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ KIMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ RESPECTOR Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	G1:3; C3:11	Fungisit(Mantar ilacı)
------	-------------	------------------------

200 g/L Tebuconazole +120g/L Azoxystrobin

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Solunması halinde;Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Etkilenen kişiyi yan yatırın. Nefes alma durursa suni teneffüs yapın. Solunum semptomları görülmesi halinde: Bir zehir merkezini veya doktoru arayın.

Deriyle temas etmesi halinde;Cilt ile temasından sonra kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın ve hemen bol suyla yıkayın. Cilde yapışırca giysileri çıkarmayın. Semptomlar ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın. Cildi bol su ile yıkayın.

Göze temas etmesi halinde;Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın. Göz kapaklarını epeyce uzağa çekerek derhal gözü iyice durulayın (en az 15 dakika). Tahriş devam ederse bir göz uzmanına danışın.

Yutulması halinde;Bilinci yerinde olmayan birine ağız yoluyla asla bir şey vermeyin. Kusmaya zorlamayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. Yutulduğunda: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. çıkarsa tıbbi yardım alın. Cildi bol su ile yıkayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) TEL: 114**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karıştırmayınız.

- Bekleme süresine uyunuz

- Kuru ve serin yerde saklayınız.

- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

- Boş kutuları usulüne göre imha ediniz, başka bir amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

İHRACATÇI FİRMA:

PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
Address: M-77, 1st & 2nd Floor, M-block Market Greater Kailash – II, New Delhi – 110048, India

İMALATCI FİRMA:

PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT.

LTD.Address: M-77, 1st & 2nd Floor, M-block Market Greater Kailash – II, New Delhi – 110048, India

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**MCP ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
KIMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ**

Fevzi çakmak Mh. 10514 Sk. No 11/1

Karatay/Konya

Tel: 0542 505 59 60

E-mail: info@mcpchemical.com